


**VI. BERICHT**  
**über die**  
**Augenkranken**  
**im**  
**k.k. Krankenhause Wieden**  
**Dr. Adler**

M  
121



22101906434







Mr. Prof. W. L. G. W. W. W.

Hubert B. Krinner

K. R. Sanilal Aiyar, Director

Einem hochzuverehrenden Herrn

Dr. Herz



# SECHSTER BERICHT

über die

## Behandlung der Augenkranken

(vom 1. Jänner bis 31. December 1878)

im

k. k. Krankenhause Wieden und im St. Josef-Kinderspitale

vom ordinirenden Augenarzte

**Dr. Hans Adler.**

---

*Separatabdruck aus dem Berichte des k. k. Krankenhauses Wieden für das Jahr 1878.*

---

WIEN 1879.

Selbstverlag des Verfassers.

1222

<b>WELLCOME LIBRARY</b>
<b>General Collections</b>
<b>M</b>
121

68523



27089 009

<b>WELLCOME INSTITUTE LIBRARY</b>	
<b>Coll.</b>	<b>welMOMec</b>
<b>Call</b>	
<b>No.</b>	WW



## I. Im k. k. Krankenhause Wieden.

Der Bericht umfasst das Solarjahr 1878. Es wurden im Ganzen 1652 Augenkranke, davon 1422 ambulatorisch behandelt.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
1872*) . . .	91	21	112
1873 . . .	862	208	1070
1874 . . .	1024	214	1238
1875 . . .	1153	251	1404
1876 . . .	1201	242	1443
1877 . . .	1289	233	1522
1878 . . .	1422	230	1652

Es hat sich somit eine ununterbrochene Zunahme der Behandlungsziffer der Augenkranken überhaupt, besonders auch im heurigen (dem 7.) Jahre ergeben.

Erwähnenswerth ist nicht nur die Anzahl der behandelten Augenkranken, sondern besonders die Wichtigkeit der hier behandelten Augenerkrankungen: So wurden im letzten Jahre hier **225 Augenverletzungen** behandelt, und zwar: 191 in der Ambulanz (hierunter 70 Fremdkörper auf der Hornhaut), 34 im Spitale; daran schliessen sich die grosse Reihe acuter Entzündungen der Conjunctiva, besonders die blennorrhöischen, diphtheritischen und membranösen Formen, aber auch viele schwerere Fälle von acuten Katarrhen und pustulösen Processen der Bindehaut, die schweren Fälle von Horn-

---

\*) Seit Bestand der speciellen Augenbehandlung im k. k. Krankenhause Wieden (25. October 1872) wurden daselbst 8441 Augenkranke behandelt.

hautentzündungen, Hornhautgeschwüren, Hornhautdurchbrüchen mit und ohne Irisvorfall, die Hornhautvereiterungen und endlich die acuten Iritiden und Glaucome. Alle diese Erkrankungen sind nach unseren genau gearbeiteten Tabellen hier weitaus überwiegend — gegenüber den chronischen Augenerkrankungen und erfordern schleunige und sachkundige Behandlung.

Die Bewohner der angrenzenden Bezirke (des IV., V. und X.) haben den ihnen bis dahin versagten Vortheil einer nahegelegenen unentgeltlichen Augenstation rasch erkannt und durch zahlreiche, seit der Einführung (1872) sich stets steigende Benützung das dringende Bedürfniss dieser Institution für diese Vorstädte erwiesen; der schlagende Beweis für die Richtigkeit dieser Aufstellung ist die Behandlungsziffer, die für die drei Bezirke: Wieden, Margarethen und Favoriten <sup>1251</sup> unter 1652 — also mehr als drei Viertel aller <sup>in Ambula</sup> Behandelten beträgt; hievon stammen 531 — also fast ein Drittel aller Augenkranken — aus dem ärmsten Bezirke Wiens: „Favoriten“.

So hat sich diese von der hohen n.-ö. Statthalterei bewilligte, von einer löblichen Direction geförderte Ambulanz auch heuer neuerdings erspriesslich erwiesen; die Spitalbehandlung der Augenkranken aber als ein constantes, den natürlichen Verhältnissen des k. k. Krankenhauses Wieden entsprechendes Bedürfniss bewährt.

Die Einrichtung der Ambulanz u. s. w. wurde schon in früheren Berichten geschildert. Die Ordination wird dermalen von 10 bis 11 Uhr Vormittags abgehalten.

Es folgt nun in Tabelle I der nach den einzelnen Formen geordnete Ziffernbericht.

I. Tabelle.

1. Conjunctiva.	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Conjunctivitis catarrh. acuta	96	53	149	4	6	10	159
„ „ chron.	25	30	55	3	3	6	61
„ epidemica . .	10	4	14	1	—	1	15
„ exanthematica .	9	6	15	1	2	3	18
„ pustulosa . .	95	107	202	3	7	10	212
„ vesiculosa . .	1	1	2	—	—	—	2

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Conjunctivitis blennorrh. acuta	3	2	5	2	5	7	12
„ „ neonat.	5	7	12	—	—	—	15
„ postvariola	—	1	1	—	—	—	1
„ diphtheritica	6	2	8	—	—	—	8
„ membranacea	11	9	20	—	1	1	21
„ trachomatosa	4	2	6	—	1	1	7
„ follicularis	11	—	11	7	—	7	18
„ granulosa (egypt.)	9	16	25	—	—	—	25
„ traumatica	12	2	14	—	1	1	15
Ulcus conj.	1	—	1	—	—	—	1
Hypoaema subconj.	4	4	8	1	—	1	9
Corpus alien. conj.	6	3	9	—	—	—	9
Combustio „	3	2	5	—	—	—	5
Xerosis „	—	1	1	—	—	—	1
Lupus „	—	—	—	—	1	1	1
Granuloma „	2	—	2	—	—	—	2
Cystis „	—	1	1	—	—	—	1
Pterygium „	—	2	2	1	1	2	4
Summe	316	255	570	23	28	51	622

## 2. Cornea.

Keratitis superficialis.	2	4	6	3	1	4	10
„ parenchymatosa	6	7	13	1	1	2	15
„ pustulosa	10	11	21	3	3	7	28
„ punctata (postica)	—	1	1	—	—	—	1
„ vasculosa	2	1	3	—	1	1	4
„ postvariola	2	1	3	—	1	1	4
„ suppurativa	1	—	1	—	1	1	2
„ neuroparalytica	1	—	1	—	—	—	1
Exfoliatio corneae	11	5	16	4	—	4	20
Ulcus „	24	22	46	4	3	7	53
„ „ cum hypop.	4	7	11	—	1	1	12
„ „ serpens	1	3	4	1	1	2	6
Abscessus „	1	3	4	—	—	—	4
Keratitis traumatica	15	2	17	4	—	4	21
Vulnus corneam perforans	1	—	1	—	—	—	1
Combustio corneae	10	1	11	4	—	4	15
Corpus alien. in cornea.	65	5	70	1	—	1	71

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Pannus . . . . .	3	7	10	4	3	7	17
Maculae corneae . . . . .	9	14	23	—	2	2	25
Leucoma „ . . . . .	4	7	11	—	1	1	12
„ „ adhaerens . . . . .	6	3	9	2	1	3	12
Sclerosis „ . . . . .	1	2	3	1	—	1	4
Cicatrix „ . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Ektasia „ . . . . .	—	—	—	—	1	1	1
Hernia membranae Descemet. . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Staphyloma corneae . . . . .	1	2	3	—	1	1	4
Keratoconus . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Phthisis corneae . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	182	111	293	33	22	25	348

### 3. Sclera.

Scleritis vera . . . . .	4	2	6	—	—	—	6
Episcleritis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Summa . . . . .	5	3	8	—	—	—	8

### 4. Iris und Chorioidea.

Iritis acuta . . . . .	10	7	17	2	2	4	21
„ chronica . . . . .	3	8	11	2	5	7	18
Kerato-Iritis . . . . .	3	3	6	5	1	6	12
Prolapsus iridis . . . . .	1	1	2	—	1	1	1
Iritis traumatica (ethyipoaema) . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Occlusio pupillae . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Mydriasis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Hyperaemia iridis . . . . .	2	1	3	1	1	2	5
Albinismus . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Coloboma iridis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Synechiae posteriores . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Cystis iridis . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Iridokyklitis . . . . .	1	1	2	1	—	1	3
Corpus alienum in iride . . . . .	—	—	—	1	—	1	1
Chorioiditis . . . . .	4	3	7	—	—	—	7
Irido-chorioiditis . . . . .	3	5	8	—	2	2	10
„ sympathica . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Ciliarreizung . . . . .	4	2	6	1	—	1	7
Kerato-Iritis traumatica . . . . .	4	—	4	—	—	—	4
Summe . . . . .	43	36	79	13	12	25	104

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
5. Glaucoma.							
Glaucoma simplex. chron. .	1	1	2	—	1	1	3
„ chron. inflamm. .	1	2	3	—	1	1	4
„ acutum . . .	1	1	2	—	—	—	2
„ haemorrhagicum .	1	—	1	—	—	—	1
„ consecutivum .	—	1	1	—	1	1	2
„ absolutum . .	—	2	2	—	—	—	2
Summe .	4	7	11	—	3	3	14

## 6. Retina und Nervus opticus.

Hyperaemia retinae . . .	3	1	4	—	1	1	5
Anaemia „ . . .	1	1	2	—	—	—	2
Hyperaesthesia „ . . .	2	—	2	—	1	1	3
Maculae „ (ex traum.)	—	—	—	1	—	1	1
Retinitis . . . . .	1	—	1	—	1	1	2
„ albuminurica . .	2	—	2	1	—	1	3
„ pigmentosa . . .	1	1	2	—	—	—	2
„ haemorrhagica . .	2	2	4	—	—	—	4
Retino-chorioiditis . . .	2	2	4	—	—	—	4
Ablatio retinae. . . . .	2	3	5	—	1	1	6
Apoplexia retinae. . . .	—	4	4	—	—	—	4
Neuritis et Neuroretinitis .	5	3	8	1	—	1	9
„ ex tumore cerebri	—	2	2	—	2	2	4
Atrophia nervi optici . .	4	2	6	2	—	2	8
Decoloratio „ „ . .	—	2	2	1	—	1	3
Neoplasma . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
Summe . .	27	24	51	6	6	12	63

## 7. Corpus vitreum.

Musci volitantes . . . .	2	4	6	—	—	—	6
Opacitates corporis vitrei .	—	1	1	—	—	—	1
Haemorrhagia in corp. vitreum	1	3	4	—	—	—	4
Summe . .	3	8	11	—	—	—	11

## 8. Lens.

Cataracta incipiens . . .	8	8	16	—	—	—	16
„ senilis . . . . .	—	5	5	2	7	9	14
„ mollis diabetica .	—	1	1	—	—	—	1



		Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
		M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Cataracta	natans . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
„	complicata . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
„	polaris anterior . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
„	capsularis . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
„	perinuclearis . . . . .	1	—	1	1	—	1	2
„	eretacea . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
„	secundaria . . . . .	1	—	1	1	—	1	2
„	traumatica . . . . .	2	—	2	3	—	3	5
Luxatio lentis . . . . .		2	—	2	1	—	1	3
Summe . . . . .		20	17	37	8	7	15	52

9. Bulbus.

Contusio bulbi . . . . .	3	1	4	1	—	1	5
Vulnera „ . . . . .	4	—	4	6	—	6	10
Vulnus sclopetarium . . . . .	2	—	2	1	—	1	3
Phthisis bulbi . . . . .	1	4	5	—	—	—	5
Panophthalmitis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Exophthalmus . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Affectio sympathica . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Mikrophthalmus . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	14	6	20	8	—	8	28

10. Amblyopiae.

Amblyopia ex abusu spirit.	7	—	7	1	—	1	8
„ „ „ nicot. tabae.	3	—	3	—	—	—	3
„ „ „ causa ignota	2	6	8	1	—	1	9
„ „ „ centrali	5	2	7	—	—	—	7
„ „ „ cum decoloratione	1	—	1	—	—	—	1
Hemeralopia . . . . .	3	—	3	1	—	1	4
Nyktalopia . . . . .	—	1	1	1	—	1	2
Diplopia . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Summe . . . . .	21	11	32	4	—	4	36

11. Refraction und  
Accommodation.

Myopia . . . . .	31	17	48	—	1	1	49
Hypermetropia . . . . .	24	14	38	—	—	—	38
Presbyopia . . . . .	1	1	2	—	—	—	2

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Astigmatismus regularis . . . . .	2	3	5	—	—	—	5
Asthenopia . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Paresis accomodationis . . . . .	1	2	3	—	1	1	4
Myodesopsia . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Makropsia post Ergotinum . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	61	38	99	—	2	2	101

## 12. Muskelkrankheiten und Neurosen.

Paresis oculomotorii part. . . . .	2	1	3	1	—	1	4
„ musculi externi . . . . .	3	1	4	—	—	—	4
Strabismus converg. . . . .	5	5	10	2	2	4	14
„ diverg. . . . .	3	2	5	—	1	1	6
Insufficiencia musc. int. . . . .	4	2	6	—	—	—	6
Neuralgia superciliaris . . . . .	9	2	11	—	1	1	12
„ trigemini . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Ptoſis . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Herpes Zoster . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Summe . . . . .	30	14	44	3	4	7	51

## 13. Orbita.

Neoplasma orbitae . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Cystis orbitae . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	2	—	2	—	—	—	2

## 14. Apparatus lacrimalis.

Dacryocystitis acuta . . . . .	2	8	10	1	—	1	11
„ chronica . . . . .	2	11	13	1	2	3	16
„ suppurativa . . . . .	1	3	4	—	1	1	5
Obliteratio sacci lacrimalis . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Dacryoadenitis . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Fistula . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Defectus carunculae lacrim. post traumat. . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	7	26	33	2	3	5	38

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
15. Palpebra.							
Oedema palpebrarum . . . . .	3	1	4	—	1	1	5
Erysipelas . . . . .	1	—	1	—	—	—	5
Eezema . . . . .	8	4	12	—	—	—	13
Abscessus . . . . .	8	1	9	2	—	2	11
Blepharoadenitis . . . . .	12	22	32	2	3	5	39
Hordeolum . . . . .	12	8	20	—	—	—	20
Chalazcon . . . . .	4	3	7	—	—	—	7
Infaretus Meibomianus . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Verruca . . . . .	—	3	3	—	—	—	3
Furunculus . . . . .	—	—	—	1	—	1	1
Neoplasma . . . . .	2	1	3	1	—	1	4
Emphysema . . . . .	1	—	2	—	1	1	2
Vulnus palpebr. . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Combustio palpebr. . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Blepharospasmus . . . . .	14	1	15	1	—	1	16
Ektropium . . . . .	6	1	7	2	1	3	10
Entropium . . . . .	—	2	2	1	1	2	4
Distichiasis et trichiasis . . . . .	2	3	5	—	1	1	6
Symblepharon . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Anchyloblepharon . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Lagophthalmus . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	80	51	131	10	8	18	149

II. Uebersichtstabelle.

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
1. Conjunctiva . . . . .	316	255	571	23	28	51	622
2. Cornea . . . . .	182	111	293	33	22	55	348
3. Sclera . . . . .	5	3	8	—	—	—	8
4. Iris und Chorioidea . . . . .	43	36	79	13	12	25	104
5. Glaucoma . . . . .	4	7	11	—	3	3	14
6. Retina u. Nervus opticus . . . . .	27	24	51	6	6	12	63
7. Corpus vitreum . . . . .	3	8	11	—	—	—	11
8. Lens . . . . .	20	17	37	8	7	15	52
9. Bulbus . . . . .	14	6	20	8	—	8	28
10. Amblyopiae . . . . .	21	11	32	4	—	4	36

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
11. Refraction und Accomo-							
dation . . . . .	61	38	99	—	2	2	101
12. Muskelkrankheiten und							
Neurosen . . . . .	30	14	44	3	4	7	51
13. Orbita . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
14. Apparatus lacrimalis .	7	26	33	2	3	5	38
15. Palpebra . . . . .	80	51	131	10	8	18	149
Am 1. Jänner 1878 war							
der Stand . . . . .	—	—	—	15	10	25	25
Totalsumme . . . . .	815	607	1422	125	105	230	1652

III. Tabelle der Aufnahme.

1878

	Ambulatorium	Spitalbehandlung			Summe
		M.	W.	Z.	
1878 Jänner . . . . .	124	17	6	23	147
Februar . . . . .	104	12	6	18	122
März . . . . .	99	13	7	20	119
April . . . . .	131	14	13	27	158
Mai . . . . .	125	3	6	9	134
Juni . . . . .	136	6	13	19	155
Juli . . . . .	221	6	5	11	232
August . . . . .	108	9	5	14	122
September . . . . .	97	4	10	14	111
October . . . . .	95	12	7	19	114
November . . . . .	92	13	6	19	111
December . . . . .	90	10	8	18	108
Verblieben 1877 . .		5	14	19	19
Totalsumme . . . . .	1422	124	106	230	1652

IV. Tabelle nach dem Wohnort der Patienten.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
I. Bezirk . . . . .	66	3	69
II. „ . . . .	17	8	25
III. „ . . . .	26	4	30
IV. „ . . . .	412	38	450
V. „ . . . .	225	45	270
VI. „ . . . .	32	10	42
VII. „ . . . .	9	—	9

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summa
VIII. Bezirk . . . . .	9	4	13
IX. „ . . . . .	6	2	8
X. „ . . . . .	476	55	531
N.-Oe., besonders die Vororte .	106	42	148
Andere Kronländer . . . . .	35	18	53
Ausland . . . . .	3	1	4
Totalsumme .	1422	230	1652

Das Ueberwiegen der männlichen Kranken, sowohl der im Ambulatorium, als auch im Krankenhause Behandelten, ist auch heuer zu constatiren und ist dies besonders durch das nahezu ausschliessliche Vorkommen von Verletzungen und Amblyopien bei Männern bedingt.

Conjunctiva, Cornea und Palpebra liefern, was Erkrankungsformen anlangt, wie immer auch diesmal das grösste Contingent.

Von den im Krankenhause Behandelten wurden 3 Männer, 2 Weiber transferirt auf andere Abtheilungen, 19 Männer, 8 Weiber gebessert, 5 Männer, 6 Weiber ungeheilt, der Rest geheilt entlassen.

Die Verpflegszeit für die Entlassenen ergibt per Kopf 28·5 Tage.

*Operationsbericht für die im Spitale Verpflegten.*

Lens.

	S. D.	E. D.	N. S. D.	S.
Extraetion nach Graefe (1 wegen Luxation) .	4	—	2	6
Discissio cataractae (3 wegen cat. secundaria) .	4	—	—	4
Reelinatio „ traum. . . . .	1	—	—	1

Iris.

Irideetomien:

wegen Glaucom. . . . .	2	—	—	2
zu optischen Zwecken. . . . .	4	1	—	5
wegen Cataracta perinuel . . . . .	1	—	—	1
„ inflam. Proesse . . . . .	1	—	—	1
als Voroperation der Cataracta . . . . .	1	—	—	1
zur Entfernung eines Fremdkörpers . . . . .	1	—	—	1
Abtragung des Prolapsus Iridis . . . . .	6	—	—	6



### Cornea.

Punctionen . . . . .	9	5	1	15
Keratotomien (nach Saemisch) . . . . .	5	4	—	9
Extraction eines Fremdkörpers aus der Cornea . . . . .	4	—	—	4
Ablatio ectasiae (Beer) . . . . .	2	—	—	2
Tätowirung der Cornea . . . . .	5	—	—	5

### Conjunctiva.

Circumcisio conj. . . . .	8	—	—	8
Pterygium-Operation (Arlt) . . . . .	2	—	—	2

### Palpebra.

Trichiasis-Operation (Flarer) . . . . .	6	—	—	6
Ectropium-Operation (Beer) . . . . .	2	—	—	2
Neoplasma-Exstirpation . . . . .	2	—	—	2
Furunkeln, Abscesse, Chalazeen . . . . .	8	—	—	8

### Bulbus.

Enucleatio bulbi wegen Staphyloma . . . . .	1	—	—	1
---	---	---	---	---

### Musculi.

Strabotomia int. . . . .	5	—	—	5
„ ext. . . . .	4	—	—	4

### Organum lacrimale.

Operation nach Petit . . . . .	5	—	—	5
„ „ Bowman . . . . .	6	—	—	6

Totalsumme . . .	99	10	3	112
------------------	----	----	---	-----

Ambulatorisch wurden 70 Fremdkörper aus der Cornea, 9 aus der Conjunctiva extrahirt und zwar 60mal Eisenstückchen, 6mal Sand, 4mal Kohle, 2mal Holz, 1mal Schmirgel, 1mal Pulver, 1mal Staub, 4mal Fremdkörper nicht bestimmten Charakters. Abscesse der Lider, Chalazeen, Operation nach Bowman und Petit, Punctionen der Cornea, Tätowirungen wurden in Summa 54 vorgenommen, so dass die Gesamtsumme der vorgenommenen Operationen 166 beträgt.

## Oculistische Mittheilungen.

Da ich im heurigen Jahre eine Anzahl von hierorts beobachteten Fällen anderweitig zu veröffentlichen beabsichtige, will ich in diesem Berichte nur das im Frühjahr 1878 aufgetretene Vorkommen einer eigenthümlichen, im städtischen Waisenhouse des V. Bezirkes beobachteten Augenerkrankung anführen.

### I. Conjunctiva.

Die Krankheit betraf die Conjunctiva und nahm einen epidemischen Charakter an. Da eine grössere Anzahl von Fällen, nur Knaben aus demselben Waisenhouse, meine Ambulanz besuchten, nahm ich über Ersuchen des Hausvaters eine gründliche Untersuchung sämmtlicher Waisenkinder vor, wobei sich mehr als ein Drittel der Kinder von derselben Krankheit befallen fand. Die schweren Fälle 11 wurden in der Ambulanz des Wiedener Krankenhauses behandelt. Sieben fernere Fälle mussten mit gleichzeitiger Corneal- und Irisreizung im Spital aufgenommen werden; den übrigen Fällen wurden Kalkwasserüberschläge ordinirt.

Bevor ich zur kurzen Beschreibung des Krankheitsbildes übergehe, will ich hier als interessant hervorheben, dass nach einer mündlichen Mittheilung meines Freundes Dr. Isidor Hein zur selben Zeit im Waisenhouse des IX. Bezirkes dieselbe Erkrankungsform mit epidemischem Charakter und gleichem Verlaufe unter den dortigen Zöglingen beobachtet wurde.

Die Erkrankung trat meist acut auf. Lichtscheu, Thränen konnten bei den zumeist scrophulösen Individuen das Bild einer pustulösen (srophulösen) Conjunctivitis vortäuschen. Es kann auch nicht geleugnet werden, dass es mehrmals theils beim Beginne theils im Verlaufe der Erkrankung zur Eruption von Bläschen am Limbus corneae oder an der Epithelfläche der Cornea selber kam. Doch konnte diese Erscheinung nicht als für die Form charakteristisch, sondern nur als eine auf geeignetem Boden bekanntlich leicht zu jeder Conjunctivitis hinzutretende Complication angesehen werden.

Als charakteristisch hingegen muss für alle Fälle starke Schwellung der Lidhant, massiges Secret, vor Allem aber das

schnelle Auftreten von rundlichen, dicht nebeneinander stehenden, mehr weniger über die Fläche hervorragenden, opaken röthlichen Knötchen, namentlich in der Uebergangsfalte bezeichnet werden.

Die Augen waren sehr reizbar gegen Licht und konnten die geringste Anstrengung nicht vertragen. Die Kinder mussten daher vom Schulbesuche ausgeschlossen werden; auch musste wegen der nachweisbaren hochgradigen Ansteckungsfähigkeit der durch Secret überimpfbaren Erkrankung für Separation der Augenkranken von den gesunden Kindern gesorgt werden.

Die Erkrankung verlief in allen Fällen acut und endete in vollständige Genesung. Die Behandlung bestand ausschliesslich in Umschlägen mit Aqua acleis, bei Hornhaut und Irisaffection gleichzeitig Atropin. Erst spät konnte gegen die restirenden katarrhalischen Erscheinungen mit der Application leichter Adstringentien (Nitr. arg. Tet. opii crocati) eingeschritten werden.

## **II. Traumen.**

Es folgen die im Hause behandelten Fälle in einer Tabelle (nach dem Hauptsitze der Verletzung) zusammengestellt.

---

Portlauf. Nr.	Verletzung	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache d. Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Alltägliche Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ansang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
1	Palpebra	L.	S = $\frac{20}{20}$	Raufhandel		S. W., Magd	40	V.	Emphysema palpebrae oculi sin.	Cat. conj.	S = $\frac{20}{20}$	Normal	Kalte Umschläge	Normal	1 Tag	17. $\frac{6}{6}$	24. $\frac{6}{6}$	9	leicht
2	Conjunctiva	R.	S = $\frac{21}{20}$	Metallstaub	bei der Arbeit	S. M., Arbeiterin	20	Moidling	Conj. traumat. oc.	Strabismus divergens o. d.	S = $\frac{18}{100}$	Normal	Nitr. arg. Strab. tomo	Normal	6 Tage	29. $\frac{3}{3}$	13. $\frac{4}{4}$	16	leicht
3		L.		Raufhandel		P. F., Pferdewärter	36	X.	Hypoaema subconj. Oedema palpebr.		S = $\frac{20}{20}$	Normal	Kalte Umschläge	Normal	2 Tage	26. $\frac{2}{2}$	4. $\frac{3}{3}$	7	leicht
4		L.		Verbrennung m. Blei	Zufall	R. E., Schulknabe	9	X.	Combustio corn. ot palp. oc. sin.			Kerat. parenchym. Trichiasis	Atropin, Praecipitat später Flaver	Diffuse Trübung der Cornea nach unten kleines Symblepharon	15 Tage	4. $\frac{2}{2}$	12. $\frac{5}{5}$	98	schwer
5	C o r n e a	R.		Verbrennung m. Kalk	Zufall	T. J., Spägl.	22	IV.	Combustio corn. d.			Keratitis suppurf.	Entfernung des Mörtels, Atropiu	Eine kleine Trübung	1 Tag	25. $\frac{4}{4}$	11. $\frac{5}{5}$	17	schwer
6		R.	Conj. graunlosa	Verbrennung m. Kalk	bei der Arbeit	K. W., Maurer	47	X.	Keratitis oc. d. superficial.			Normal	Atropin	Normal	28 Tage	29. $\frac{10}{10}$	11. $\frac{11}{11}$	14	schwer



7	Beide	Pulver-explosion	Zufall	W. R., Schul- knebo	14	Meidling	Combustio cor- neo oc. u. levis			Normal	Atropin, Hirudines	Restitutio ad inte- grum	2 Stun- den	4. $\frac{4.}{7.}$	6. $\frac{6.}{7.}$	3	schwer
8	L.	Eisen- splitter	bei der Arbeit	C. J., Wagen- schmit- zer	52	Meidling	Ulcus corneo sin.			Normal	Atropin, Saonisch 4 Punc- tionen, Laxans	Normal	6 Tage	2. $\frac{2.}{8.}$	10. $\frac{10.}{8.}$	9	schwer
9	L. Staphy- locar	Holz- splitter	bei der Arbeit	M. G., Fabriks- arbeiter	26	X.	Ulcus corneo sin.	Loucoma adhae- rens.		Normal	Hirudines, Atropin	Normal	6 Tage	1. $\frac{1.}{5.}$	10. $\frac{10.}{5.}$	10	schwer
10	L.	Sand	bei der Arbeit	S. F., Stein- metz	16	X.	Keratitis super- fic.			Normal	Ent- fernung d. Sandes, Atropin	Normal	3 Tage	1. $\frac{1.}{10.}$	26. $\frac{26.}{10.}$	26	schwer
11	R.	Eisen- splitter	bei der Arbeit	M. J., Maurer	24	Sitzen- berg N.-Oe.	Corpus alienum corneae d.	Ciliar- infect. Verfär- bung d. Iris		Normal	Ent- fernung d. Splitters, Hirudines, Atropin	Normal	2 Tage	21. $\frac{21.}{4.}$	26. $\frac{26.}{4.}$	6	schwer
12	R.	Schleif- stein- splitter	bei der Arbeit	W. G., Ma- schinen- wärter	45	X.	Keratitis ex cor- pore alieno			Normal	Ent- fernung d. Fremd- körpers	Normal	8 Tage	12. $\frac{12.}{11.}$	14. $\frac{14.}{11.}$	3	schwer
13	L.	Auf- lösen einer Flamme	bei der Arbeit	A. Z., Buch- binder	16	IV.	Keratitis super- ficial. oc. sin.	Verbren- nung 1. Grades im Be- reiche d. Lides u. d. Joch- bogens		Normal	Atropin	Normal	1 Tag	6. $\frac{6.}{11.}$	10. $\frac{10.}{11.}$	5	leicht



Portlauf. Nr.	Verletzung	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache d. Verletzung	Verschieden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Alltägliche Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
14	L.	18/30		Mörtel darauf auswaschen mit Wasser	bei der Arbeit	G. J., Maurer	44	Hietzing	Keratitis superficialis	Verbrennung der Conjunctiva	10/70	Normal	Die Entfernung d. Mörtelpartikeln — Einpinseln m. Ol. oliv. Atropin Hirudines Laxans	Normal	4 Tage	1. 8. 12. 8.	12	schwer	
15	R.	18/20		Unvorsichtiges Öffnen eines Spiritusfasses	bei der Arbeit	H. S., Hausknecht	44	X.	Keratitis		10/70	Normal	Atropin Hirudines Laxans	Normal	8 Tage	29. 1. 4. 3.	35	schwer	
16	L.	20/20		Eisensplitter	bei der Arbeit	H. A., Schloss.	17	V.	Corpus alienum in iride			Normal	Iridectomy. Verband	Normal	1 Tag	4. 4. 18. 4.	15	schwer	
17	Beide			Staub in der Werkstätte	bei der Arbeit	P. W., Tischler	16	VI.	Kerato-Iritis praecipue oc. d. gradus lovis			Normal	Atropin Laxans	Normal	21 Tage	7. 12. 23. 12.	17	schwer	
18	L. S = 20/20			Sandsteinstaub	bei der Arbeit	D. S., Steinmetz	24	IV.	Kerato-Iritis oc. sin.			Normal	Atropin dann Tect. opii croc.	Normal	4 Tage	7. 10. 16. 11.	41	schwer	

C o r n e a      I r i s

19	I r i s		L. S = $\frac{20}{20}$	Eisen- splitter	bei der Arbeit	B. W., Eisen- dreher	19	X.	Koroto-Iritis cum Hypopio			Ganze Vor- dorkammer eiter- orfüllt. Gros- ser Schmerz, spät. Affectio sympathica	Hirudinos 2mal Laxans Atropin — Enuclea- tio bulbi Freund- körper im Corpus- ciliare	R. A. S = $\frac{19}{20}$	2 Tage	$\frac{26.}{8.}$	$\frac{16.}{11.}$	83	schwer
20			L.	Eisen- span	bei der Arbeit	S. K., Schloss.	20	IV.	Kyklitis oc. sin.	Ein feiner Riss in der Iris	S = $\frac{18}{100}$	Bedeutender Schmerz	Atropin- Verband, Laxans	S = $\frac{20}{20}$	6 Tage	$\frac{25.}{6.}$	$\frac{6.}{7.}$	12	schwer
21	Retina		R. S = $\frac{20}{20}$	Schuss vor den Augen	Uebel- fall	J. J., Finanz- wach- mann	24	X.	Maculae retinae d.	Die Glabella pulver- geschw.	Finger in 3'		Hirudines. Kal. jodat. Strychnin- inj.	S = $\frac{5}{10}$	4 Stun- den	$\frac{16.}{8.}$	$\frac{23.}{9.}$	39	schwer
22			L.	Stein- wurf		M. G., Schul- knabe	7	Weigels- dorf N.-Oe.	Cataracta traum. cum hypopio	Ablatio retinae part. (wahr- schein- lich)	Schoin!	Lichtem- pfindung etwas ge- hoben	Discission — Punctio corneae — Cataracta- operation nach Jäger	Ablatio re- tinae go- ngen die Nasenseite constatirt	Mo- nate	$\frac{2.}{10.}$	$\frac{20.}{12.}$	89	schwer
23	L e n s		R. S = $\frac{20}{20}$	Blech- stück	Znfall	B. J., Schuster	18	III.	Cataracta trau- matica			Trübung der Linse, bildet sich allmählig	Hirudines, Discission	Cataracta- flocken ragen in d. vord. Kammer	4 Tage	$\frac{8.}{4.}$	$\frac{3.}{8.}$	118	schwor
24			R.	Anrall eines Stein- stücks	bei der Arbeit	L. P., Stein- brecher	36	Mödling	Cataracta traum. mol. oc. d.		Licht- empfin- dung	Schmerz	Extraction nach Gräfe	Eiter in d. Vorkammer Kyklitis. Atrophia bulbi	14 Tage	$\frac{12.}{4.}$	$\frac{13.}{5.}$	32	schwer

Fortlauf. Nr.	Verletzung	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache d. Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Altfällige Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
25	L e n s	L.	L. S = $\frac{1}{16}$	Schlag mit einem Stock	Raufhandel	K. F., Vergolder	17	V.	Luxatio lent. traum. oc. sin.		S = $\frac{6}{60}$	Choroiditis, Kyklitis	Lappenschnitt n. abwärts, dectomie —Hirudin. —Kal.jodat. Köcheln, Atropin	Finger in 2'	7 Tage	8. 8.	23. 9.	46	schwer
26	L.	L.		Hammer-schlag	Zufall	S. L., Schloss.	15	Inzorsdorf	Contraio bulbi sin.	Hae-morrhag. in corpus vitr.			Hirudines, Laxans	Ablatio retinae totalis	5 Stunden	2. 7.	6. 7.	5	schwer
27	L. s	L.		Eisen-splitter	bei der Arbeit	R. M., Eisen-dreher	55	IV.	Vulnus contusum bulbi sin. — nach innen unten am Ciliar-rande	Trübungen d. Glaskörpers	Handbewegungen in 10 Cm.	prompt, Trübung wird geringer	Laxans, Hirudines, Atrop. Pylokarpin-injection.	Finger in 12 Cm. prompt	1 Tag	20. 10.	19. 11.	20	schwer
28	B u l b u s	R.	S = $\frac{20}{20}$	Anprall eines Nagels	bei der Arbeit	D. W., Maurer	33	X.	Vulnus cont. bulbi d. nach innen ob. $1\frac{1}{2}$ Mm. langer Scleralriss	Vorderkammer mit Blut erfüllt		Blut resorbiert sich	Hirudines, Eis, Atrop. Laxans	Lichtempfindung	1 Tag	1. 9.	27. 9.	27	schwer
29	L. s	L.	S = $\frac{20}{20}$	Faustschläge		D. F., Knoch	21	X.	Vulnus cont. bulbi s. Innen oben, Corpus ciliare, corneae, Sclera durchriss.	Pro-lapsus iris		Chomosis	Kappung des Pro-lapsus	S = $\frac{19}{40}$	1 Tag	22. 7.	17. 8.	27	schwer

30	R. S = $\frac{20}{20}$	Eisenstück	bei der Arbeit	K. J., Schloss.	33	X.	Vulnus punct. palp. sup. et. corn. d. — Exfoliatio corneae	Normal	Normal	Iris gezeichnet. Prolapsus iridis. Cataracta	Kappung des Prolapsus, Hirudines, Calomel	Normal	1 Tag	$\frac{20}{11}$	$\frac{27}{11}$	8	leicht
31	R. S = $\frac{20}{20}$	Glühendes Eisenstück	bei der Arbeit	W. F., Schloss.	22	VI.	Vulnus scissum bulbi d.; $1\frac{1}{2}$ Cm. lange, nach innen unten gelegene, Cornea u. Sclera perforierende Wunde	Auch d. untere Augenhid durchbohrt	Handbewegungen in 2'	Handbewegungen in 2'	Handbewegungen	Wundgeheiltheit, Handbewegungen	6 Stunden	$\frac{24}{1}$	$\frac{30}{3}$	66	schwer
32	L. S = $\frac{20}{20}$	Meissel durch Rückstoss ins Auge	bei der Arbeit	R. J., Schloss.	31	X.	Vulnus scissum bulbi sin., nach innen unten Cornea u. Sclera, 1 Cm. weit durchbohrend	Bedeutender Glaskörper vorfall	Handbewegungen in 1'	Granulation am Rande d. Wunde, Ectasie der Sclera nach innen, Linsenflocke in d. vorderen Kammer	Kappung des Granuloms, Atropin, Hirudin, Këcheln	Wundgeheiltheit, Handbewegungen	Stunden	$\frac{12}{2}$	$\frac{21}{3}$	38	schwer
33	R. S = $\frac{20}{20}$	durch Unvorsichtigkeit	beim Pöller-schies-sen	H. F., Fabriksarbeiter	21	Grafenbach N.-Oe.	Vulnus sclopeterium bulbi sin., im Cornealcentr. eine kleine Lappenwunde	Cornea trüb	Licht und Schatten	Kykklitis	Hirudines, Atropin, Laxans, Eserin	Wundgeheiltheit	21 Tage	$\frac{25}{5}$	$\frac{7}{6}$	14	schwer
34	Beide	Sandsteinstaub	bei der Arbeit	R. A., Steinmetz	30	IV.	Nyctalopia oc. utr.	Cat. conj. ac. oc. utr. Chala-zeon oc. s.	R. S = $\frac{18}{50}$ L. S = $\frac{18}{200}$		Rauchgraue Gläser, Laxans	R. S. = $\frac{18}{20}$ L. S. = $\frac{18}{20}$	4 Monate	$\frac{10}{1}$	$\frac{4}{3}$	54	schwer

## II. Im St. Josef-Kinderspitale \*).

Es wurden im Jahre 1878 ambulatorisch 395 Augenranke behandelt; in Spitalsbehandlung standen 66, im Ganzen also 461. Folgende grössere Operationen wurden von mir daselbst ausgeführt: 1 Staphilomoperation nach Critchett, 1 Strabotomie, 15 Punctionen der Hornhaut, 7 Iridectomien.

---

\*) Der Detailbericht ist im „37. Berichte über das St. Josef unentgeltliche Kinderspital 1878“ enthalten.





